

ANEXA 6.

Nr. 727 /O/18.06.2026.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 13 /18.06.2026.



Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena* sau **monilioza sâmburoaselor**.

Primele simptome ale bolii apar primăvara, pe florile și frunzele tinere care se ofilesc și se brunifică. Atacul se aseamănă cu efectul înghețurilor târzii, cu aspect opărit, florile și frunzele uscate rămânând pe ramuri tot timpul anului. Pe fructele tinere atacate apar pete brune care cresc treptat și se înmoaie. Mai târziu fructele se lipesc între ele, se mumificază și rămân în pomi pe timpul iernii. Pe suprafața fructelor apar pete mici cenușii, care sunt forme de rezistență și înmulțire a ciupercii. Primăvara, pe vreme umedă și răcoroasă, conidiile iernate pe fructele mumificate determină infecția primară pe frunze și flori.


Monilioza apare și la sâmburoase, dar atacul se manifestă mai frecvent pe fructele dezvoltate. Pe suprafața fructelor apar pete rotunde, brune, care se extind repede, în câteva zile fructele putrezesc și cad. Boala se manifestă și în cursul depozitării, determinând putrezirea și înnegrirea rapidă a fructelor.

Al doilea tratament se efectuează la intrarea în pârgă a celui mai timpuriu soi, cu unul din următoarele fungicide:

- **CHORUS 50 WG** în doză de 0,45-0,75 kg/ha sau,
- **FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW** – a doua denumire comercială) în concentrație de 0,075% (0,75 l/ha în 1000 l apă) sau
- **LUNA EXPERIENCE 400 SC** în doză de 0,5 l/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.



<https://www.botanistii.ro/blog/monilioza-fructelor-de-samburoase-monilinia-laxa/>



<https://www.glissando.ro/product/monilioza/>

<https://www.syngenta.md/news/produse/monilioza-florilor-lastarilor-si-fructelor>

Metode durabile: Pentru prevenirea extinderii bolii este necesară tăierea și arderea ramurilor bolnave împreună cu 10 cm de ramură sănătoasă. Este foarte important ca din toamnă să se adune fructele putrezite sau mumificate din jurul pomilor (sau din pomi) și să se îngroape sau distrugă.

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: *Rhagoletis cerasi* sau **musca cireșelor și vișinelor**.

Musca adultă are corpul lung de 3-4,5 mm, femela fiind puțin mai mare, de culoare brună-negricioasă. Capul, scutелul și vârful femurelor sunt galbene-roșcate, iar pronotul prezintă dungi galbene și negre. Larva de 5-6 mm este albă, apodă și acefală. Prezintă o singură generație pe an și iernează în sol, în stadiul de pupă. Adulții încep să apară în a doua jumătate a lunii mai, iar la 1-2 săptămâni după împerechere, o femelă depune cu ovipozitorul câte un ou în fructele de cireș sau vișin aflate în pârgă. O femelă poate depune 100-150 ouă, iar după apariție, larvele se hrănesc cu pulpa fructelor. Fructele atacate se înmoaie, se brunifică și putrezesc, atât pe pom cât și după recoltare. După dezvoltarea deplină, larvele se retrag în sol la 2-5 cm adâncime, unde se transformă în pupe, rămânând în acest stadiu până în primăvara anului următor.

Pentru prevenire și combatere se recomandă efectuarea tratamentelor cu unul din următoarele insecticide:

- **KARATE ZEON (NINJA** – a doua denumire comercială) în concentrație de 0,015 % sau
- **LASER 240 SC (NEXUBA** – a doua denumire comercială) în concentrație de 0,06 % sau
- **POLECI (DECA 2,5 EC** – a doua denumire comercială) în doză de 0,3-0,5 l/ha (în concentrație de 0,03-0,05% în 1000 l apă) sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.