

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS
Nr. 13 / 18.06.2026.

A gyümölcsfákat károsító monília *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena* ellen.

Az első tünetek a csonthéjasoknál tavasszal jelennek meg, a virágokon és a fiatal leveleken, amelyek elhervadnak és megbarnulnak. A támadás hasonlít a késői fagyok leforrzásához, majd a megszáradt virágok és levelek a fán maradnak egész évben. Az éretlen gyümölcsökön barna, kerek foltok jelennek meg, amelyek meglágyulnak. Később a gyümölcsök összeragadnak majd összeszáradnak és így maradnak egész télen. A felületükön kicsi, domború, szürke foltok alakulnak ki, amelyek a gomba kitelelő és szaporító formája. Tavasszal, nedves és hűvös időben a mumifikálódott gyümölcsökön levő, kitelelő konídiumok okozzák az elsődleges fertőzést a virágokon és leveleken.

A monília az almaféléket is károsítja, de a támadás inkább a kifejlett gyümölcsökön jelenkezik. A felületükön kerek, barna foltok jelennek meg, amelyek gyorsan terjednek, majd néhány nap múlva megrothadnak és leesnek. A betegség raktározás közben is megjelenik, a gyümölcsök megbarnulnak, meglágyulnak és megfeketednek.

A második kezelést a legkorábbi fajták érése kezdetén kell elvégezni, a következő gombaölő szerek egyikével:

- **CHORUS 50 WG** 0,45-0,75 kg/ha adagolással vagy,
- **FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,075% koncentrációban (0,75 l/ha adagolással 1000 l vízben) vagy,
- **LUNA EXPERIENCE 400 SC** 0,5 l/ha adagolással vagy más, hasonló hatású növényvédőszer is lehet használni, azzal a kitétellel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

Fenntartható módszerek:

A megelőzéshez szükséges az ültetvények folyamatos szemrevételezése, a beteg ágak levágása 10 cm egészséges hajtásrészrel együtt és azoknak az elégetése. Nagyon fontos még ősszel összeszedni, elásni vagy megsemmisíteni a megromlott, mumifikálódott gyümölcsöket a fák alól vagy a fákról.

A vegyszermentes eljárásokat előnyben kell helyezni, abban az esetben ha megfelelő védelmet biztosítanak.

A cseresznyét és meggyet károsító cseresznyelég (*Rhagoletis cerasi*) ellen.

A kifejlett légy hossza 3-4,5 mm, a nőtény kissé hosszabb, teste feketés barna színű. A feje, pajzscskája és a lábainak vége vöröses sárga színű, az előháta fekete és sárga csíkos. A kifejlett, fehér lárva hossza 5-6 mm, láb és fej nélküli. A kártevő évente egy nemzedéket fejleszt ki és báb alakban tel. A legyek május második felében szoktak megjelenni, majd a párzás után 1-2 héttel a nőtény egy petét helyez a zöld vagy éppen színeződő gyümölcs héja alá. Egy nőtény átlagban 100-150 petét rak le, majd a kikelés után a lárvák a gyümölcs húásával kezdenek táplálkozni. A megtámadott gyümölcsök megpuhulnak, megbarnulnak és megrothadnak, úgy a fán mint szedés után. A teljes kifejlődés után a lárvák behúzódnak a talajba 2-5 cm mélyre, ahol bábbá alakulnak át, ebben az állapotban maradva következő tavaszig.

A károsítások megelőzésére ajánlatos az első kezelést a következő rovarölő szerek egyikével elvégezni:

- **KARATE ZEON (NINJA** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,015 % koncentrációban vagy,
- **LASER 240 SC (NEXUBA** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,06 % koncentrációban vagy
- **POLECI (DECA 2,5 EC** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,3-0,5 l/ha adagolással (0,03-0,05% koncentrációban, 1000 l vízben) vagy más, hasonló hatású növényvédőszer is lehet használni, azzal a kitétellel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).