

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS

Nr. 26/ 30.09.2026.

Az őszi gabonaféléket károsító **Köüszög** (*Tilletia spp.*), **Kalászfuzáriózis** (*Fusarium sp.*), **Szeptóriás levélfoltosság** (*Septoria tritici*), **Porüszög** (*Ustilago spp.*) ellen.

A betegségek első tünetei ősszel már megjelenhetnek, majd az éghajlati körülmények függvényében ezek elterjednek, jelentős károkat okozva.

- a tejérés idején a kalászkok szélesebbek lesznek, több maggal a kaláskában. Később a szemek fekete, zsírszerű, kellemetlen szagú tömeggé alakulnak át, amely száradás után szétporlik és az egészséges szemeket megfertőzi, így terjesztve a fertőzést (Köüszög).

- a fertőzés korán jelentkezhet, a csírázó növénykék megcsavarodnak, nem bíjnak ki és elrothadnak. A csokrosodó növények töve megbarnul. A kalász megjelenésekor egy része megsárgul, majd rózsaszínű lesz. Az elszíneződés elterjed az egész kalászra, a szemek töppedését okozva (Kalászfuzáriózis).

- a leveleken hosszú, elliptikus sárga foltok jelennek meg, amelyek megbarnulnak. Idővel a foltok szürkésre váltanak, barnás-szürke peremmel. Később a foltokon hosszanti irányban fekete pontocskák jelennek meg. Később a betegség áttér a kalászra, ahol a szemek töppedését okozza (Szeptóriás levélfoltosság).

- a jellegzetes tünetek a kalász kialakulásakor jelentkeznek. A kalász alkotóelemei sötétbarna, spóratömeggé alakulnak át, emiatt távolról elszenesedettnek néznek ki (Porüszög).

A maggal terjedő betegségek ellen ajánlatos a kalászosok vetőmagját a következő csávázó szerek egyikével kezelni:

- **AMIRAL PROFY 6 FS** 0,5 l/t vetőmag adagolással vagy
- **REDIGO PRO 170 FS** 0,5 l/t vetőmag adagolással vagy
- **SPONSOR 6 FS** (**TEBUSA 6 FS** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,5 l/t vetőmag adagolással vagy
- **TENAZOL 60 FS** (**VITADIN SEED 6 FS** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,5 l/t vetőmag adagolással vagy más, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitéttel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

A drótféreg (*Agriotes sp.*) ellen ajánlatos a **SIGNAL 300 FS** (**LANGIS** – a második kereskedelmi elnevezés) csávázó szert használni, 2,5 l/t vetőmag adagolással, a használandó gombaölő szerrel együtt, vagy a **THRINTOBA 20 CS** (**IBRIDITRIN 20 CS** – a második kereskedelmi elnevezés) 1 l/t vetőmag adagolással.

Egyéb ajánlatok:

- Nagy figyelemmel kövessék a vegyszerek kompatibilitási előírásait abban az esetben ha több vegyszert kevernek össze.

- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !

- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszerek használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényt (Legea nr. 383/2013, Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A., Ordinul comun nr. 45/1991).

- Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 53/2025; HG 1230/2012), a mezőgazdászok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait és minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelésekről.